


Cyto-Red™

Potenciador Foliar del Color del Fruto.



Fabricado por:

cytozyme
© 2004 Cytosystems, Inc.

Cytozyme Laboratories, Inc.
 134 South 700 West
 Salt Lake City, Utah, 84104 USA

Beneficios de Cyto Red™

- **Cyto-Red™** incrementa y acelera el desarrollo del color del fruto, manteniendo su firmeza y calidad una vez cosechado.
- Permite una cosecha más homogénea y por lo tanto se puede programar de manera más efectiva.
- Se obtienen mayores ingresos al conseguir un porcentaje mayor de frutos de mejor color.



Certificado para uso en sistema electrostático

Contenido Neto
1 Litro

LIGERAMENTE TÓXICO
 LJNHN22 AGAJ



Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
 Calle La Esparceta N°146, Valle Hermoso
 Surco - Lima - Perú - Teléfono: (511) 3440108
 E-mail: servicioalcliente@cytoperu.com
 www.cytoperu.com

Cyto-Red™



Cyto-Red™ es un estimulador biológico que incrementa y acelera el desarrollo del color natural del fruto. Producto formulado por Cytozyme Laboratories, Inc., mediante su proceso de fermentación orgánica exclusivo.


Cyto-Red™ está compuesto por elementos naturales por lo que no deja residuos tóxicos en los frutos ni en las plantas. Este producto ha sido aprobado por la **OCIA (Organic Crop Improvement Association)**.

Cyto-Red™ lleva en su composición Potasio, Magnesio, Boro, otros microelementos y un 20% de materia orgánica compuesto de aminoácidos, proteínas, polisacáridos, vitaminas, nucleótidos y extractos de algas marinas.

Resultados de la aplicación de CytoRed en racimos de vid.



Sin Cyto-Red™



Con Cyto-Red™

Potenciador Foliar del Color del Fruto Dosis y momento de aplicación

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis
Uva de mesa	Justo antes del envero (cambio de color) Repetir 10 días después	4 lts./ha. por aplicación
Uva de vino	Justo antes del envero para mejorar grados brix y adelantar cosecha	2,5 lts./ha.
Pomáceas	Al inicio del envero y repetir 10 días después	1,7 lts./ha. por aplicación
Frutales de hueso	Al inicio de envero, repetir 7-10 días después	1,7 lts./ha. por aplicación
Tomate, pimiento	Al inicio del envero, Repetir 7-10 días después	2,5 lts./ha. por aplicación
Fresa, Frambuesa	Al inicio del envero de cada ramo floral	3,0 lts./ha. por aplicación
Citricos	Al inicio del envero	4,0 lts./ha. por aplicación
Mango	Al inicio del envero	4,0 lts./ha. por aplicación

Modo de aplicación:

Agitar bien el envase antes de abrir. Prediluir cada litro de **Cyto-Red** en 10 litros de aguas removiendo hasta la total disolución. Llenar el tanque aplicador hasta la mitad, añadir el producto y terminar de llenar el tanque en agitación continua hasta haber aplicado el producto.

Compatibilidad:

Cyto Red es compatible con la mayoría de los pesticidas del mercado. En caso de duda realizar una pequeña prueba antes de la mezcla total.

Cyto Red puede actuar como transportador de pesticidas mejorando su absorción. Por esta razón se recomienda hacer una prueba antes de aplicar mezclado con productos azufrados.

Fitotoxicidad:

Cyto Red no es litotóxico. Algunas variedades de ciruelo y melocotón pueden presentar una cierta sensibilidad a las aplicaciones foliares.

LOTE:

F.V: