

Ca-16

Nutrición foliar rica en Calcio

COMPOSICIÓN		PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
INGREDIENTES	CONTENIDO	PARÁMETRO	VALOR
Calcio (CaO)	16,0 % p/v	Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
		pH	7,4
		Densidad a 20 °C	1.340 g/L

Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm

RECOMENDACIONES DE USO PARA APLICACIÓN FOLIAR		
CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándanos	5 L/ha	10 días después de que la caída de pétalos ha terminado. Repetir de una a tres veces, en intervalos de 10 a 14 días.
Cerezos	5-10L/ha	Realizar aplicaciones regulares en intervalos de 7 a 14 días, desde la caída de pétalos hasta una semana antes del inicio de la cosecha.
Ciruelo, damasco, duraznos y nectarinas	5-8 L/ha	En intervalos de 7 a 14 días desde caída de pétalos hasta una semana antes de cosecha.
Manzanos	5-10 L/ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con 5L/ha; la primera aplicación con frutos de 3 a 4 cm, repetir cada 10 días. Posteriormente, realizar de 3 a 5 aplicaciones cada 15 días hasta inicio de cosecha, en dosis de 10L/ha.
Uva de mesa	5 L/ha	Aplicar junto con la primera y segunda aplicación de ácido giberélico en crecimiento de bayas y repetir en cierre de racimos.
Uva vinífera	3-5 L/ha	Realizar 3 aplicaciones durante el crecimiento de las bayas en intervalos de 10 a 15 días.

NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA

Advertencia: El uso del producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta no se espera que afecte negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. El usuario asume todos los riesgos del uso y manejo. En un esfuerzo por reducir el riesgo de daño al cultivo, se recomienda aplicar por la mañana temprano o tarde en la noche. Uso de acuerdo con las recomendaciones de una persona calificada o institución, tales como pero no limitado a, un asesor de cultivos certificados, ingeniero agrónomo, publicación universitaria de extensión de los cultivos, o aplicar de acuerdo a las recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. Consulte a su representante del Distribuidor para más información. Lea las Condiciones de Venta-Garantía y limitaciones de responsabilidad y recursos antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva el producto, sin abrir, y el precio de compra será reembolsado. Esta etiqueta se cree que es confiable y debe ser seguida cuidadosamente. Lesión en el cultivo al que se aplica el producto puede ser consecuencia de la ocurrencia de condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o el no seguir las instrucciones de la etiqueta o las buenas prácticas de aplicación, todos los cuales están fuera del control de Agroadvance SpA o el vendedor. Además, no seguir las instrucciones de la etiqueta puede causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medio ambiente. La empresa garantiza que este producto cumple con la descripción química en la etiqueta y es razonablemente adecuado para los fines mencionados sujetos a los factores indicados anteriormente, que están fuera del control de la Empresa. La Empresa, ofrece ninguna otra garantía o representaciones de ningún tipo, expresa o implícita, en relación con el producto, incluyendo no garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin particular, y dicha garantía no se considera implícita en la Ley.

Instrucciones de Uso

- Llene el equipo pulverizador con agua, a 2/3 de su capacidad.

- **Agite** y disuelva el producto **Ca-16**.

- Complete con agua al volumen requerido. Una vez preparada la solución aplique inmediatamente al cultivo.

- Aplique con un volumen suficiente de agua que permita asperjar copa y frutos, idealmente con nebulizador. Considere utilizar boquillas de cono lleno con tamaño de gota entre 120 y 160 micrones. En el caso de hortalizas mediante barra.

- Evite las horas de temperaturas extremas (bajo 2 °C o sobre los 25 °C) y/o días con humedad relativa alta o donde ha ocurrido helada, por la sensibilidad de la epidermis del fruto.

- No olvide tomar las debidas medidas de seguridad para cada aplicación foliar.

Precauciones

Lea bien la etiqueta antes de usar el producto y manténgase en un lugar seguro, fresco, seco y fuera del alcance de los niños, animales y personas ajenas al manejo de agroquímicos.

Compatibilidad: No mezclar con productos de reacción ácida o alcalina, derivados cúpricos y aceites minerales. **Ca-16** es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de reactividad antes de su aplicación.

Fitotoxicidad: No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta.

TAMBOR
208
LITROS

Producto fabricado por
Agroadvance SpA.
Camino Melipilla 26.200, Peñafiel.
Fono: +56 2 270 85 377
www.agroadvance.cl



**AGRO
ADVANCE®**
BIOTECNOLOGÍA

