

En Vivo SC

EL BIOINSECTICIDA DE ALTA EFICACIA, SEGURO Y SIN RESIDUOS

Ingrediente activo:

Virus de la poliedrosis múltiple nuclear de Mamestra brassicae Cepa CHb1 (VPN).

Concentración y formulación:

Biopotencia 2x10⁹ CIP/ml
Suspensión Concentrada (SC)

Registro SAC:

N° 1894-O

- ▶ **El VPN actúa por ingestión** en el interior del insecto donde genera réplicas de sí mismo, provocando que la larva enferme hasta que finalmente muera. El período de acción es de 2 - 7 días y la persistencia promedio en campo es de 10 - 14 días.
- ▶ **Alta eficacia** en larvas de Lepidópteros (polilla de la manzana, polilla oriental, polilla enrolladora, polilla del tomate, polilla de la papa y la polilla dorso de diamante).
- ▶ **Producto no tóxico** para abejas, enemigos naturales ni controladores biológicos.
- ▶ **Seguro** para el ser humano en la manipulación y aplicación del producto. Puede aplicarse en precosecha y cosecha por **no dejar residuos** en los cultivos.



ÚNICO Registro de Virus de las Poliedrosis Nuclear (VPN) en Chile.




CERO residuos



BIOLÓGICO con autorización SAG para uso en Agricultura Orgánica



SELLO BEESAFE menor impacto sobre insectos benéficos y polinizadores




▶ BIOINSECTICIDA




TE BRINDA ENTRE 10 A 14 DÍAS DE PROTECCIÓN SOBRE TU CULTIVO!

ENSAYOS DE EFICACIA DE EN VIVO[®] SC TEMPORADA 2020-2021


Promedio de **Repollos** infestados por larvas de *Plutella xylostella*




Promedio de **Duraznos** infestados por larvas de *Cydia molesta*



Promedio de **Arándanos** infestados por larvas de *Proeulia aurarea*



Promedio de **Manzanas** infestadas por larvas de *Cydia pomonella*



■ CONTROL ■ En Vivo^{sc} ■ INDOXACARB 30 WB ■ CLORANTRANIPROLE 20 SC DDA= DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN

Fuente: Ing. Agr. Dra. Cs Karina Buzzetti del Centro Investigación Agri Development Ltda.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

Aplicar En-Vivo[®] SC junto a un regulador de pH, para mantener el agua a pH neutro a ligeramente ácido (5,5 a 6,5).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzana, Pera	Polilla de la Manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	180 cc/hL	Momento de aplicación: Aplicación vía foliar según monitoreo de la plaga, posicionando el uso al inicio del nacimiento de las larvas. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento: de 1.000 - 2.500 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del huerto.
Durazneros, Ciruelos, Cerezos, Pluot, Damascos, Plumcot, Nectarines	Polilla Oriental (<i>Cydia molesta</i>)		
Nogales	Polilla de la Manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	150 cc/hL	
Arándanos, Vides de mesa, viníferas y pisquera	Polilla Enrolladora (<i>Proeulia auraria</i>)	150 cc/hL	Momento de aplicación: Aplicación vía foliar según monitoreo de la plaga, posicionando el uso al inicio del nacimiento de las larvas. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento: 500-2.000 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del huerto.
Repollo, Brócoli, Coliflor, Repollos de brusela	Polilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	125 cc/hL	Momento de aplicación: Aplicación vía foliar según monitoreo de la plaga, posicionando el uso al inicio del nacimiento de las larvas. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento: 200-1.000 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Tomate	Polilla del tomate (<i>Tuta Absoluta</i>)	180 cc/hL	Momento de aplicación: Aplicación vía foliar según monitoreo de la plaga. Intervalo entre aplicaciones: 14 días. Mojamiento: 300 a 1000 L de agua/ha dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Papa	Polilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>)		

AUTORIZACIÓN PARA USO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LOBESIA BOTRANA SAG

PLAGA	CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
<i>Lobesia botrana</i>	Vid, arándano y ciruelo	250 cc / hL	No posee restricciones en el número de aplicaciones durante la temporada.



! No requiere refrigeración, ni condiciones especiales de almacenaje

Presentaciones: 1L, 20L

Esta Información es una referencia, favor remitirse al dato oficial de la etiqueta que está publicado en www.point.cl o contactarse a nuestro departamento técnico a chile@pointamericas.com.

Información actualizada de este material impreso 02/2023.